



<i>Chamaerops excelsa</i> Hort. non Thunb.	07	<i>Citrus aurantium</i> L. - Arancio amaro	10
Fam. Palmae Fam. Rutaceae		Fam. Rutaceae	
Palma originaria della Cina che raggiunge l'altezza di 12 metri con foglie orbicolari e segmenti lineari pieghettati, portati da piccioli finemente dentati lunghi 1 metro. Fiori piccoli, gialli, riuniti in pannocchie, lunghe fino a 60 cm che sbocciano in maggio-giugno. Frutti globosi, non eduli, di colore blu-nero. Cresce bene in terreno medio sciolto, soleggiato, asciutto nel periodo autunno - invernale ma non nel periodo estivo. Esposizione soleggiata e ben riparata dal freddo.		Albero sempreverde originario di India e Cina con trunco diritto. Le foglie sono alterne, picciolate, semipersistenti. I fiori, che permangono per gran parte dell'anno, molto profumati, sono formati da 3-5 sepali verdi, 4-8 petali bianchi contenenti anche loro ghiandole di essenza. I frutti, colorati arancio, sono delle bacche con pericarpo carnoso (buccia o scorza), provvisti di abbondanti taccuine secretrici che contengono una polpa molto sugosa, di gusto amaro, divisa in spicchi, che risultano dalla trasformazione delle logge dell'ovario. Gli aranci maturano i loro frutti durante la stagione fredda.	
<i>Chamaerops humilis</i> L. - Palma nana	08	<i>Citrus bergamia</i> Risso et Poit. - Bergamotto	11
Fam. Palmae		Fam. Rutaceae	
E' l'unica palma spontanea che cresce nelle regioni meridionali d'Italia. Ha fusto nullo o assai corto che normalmente non supera il metro di altezza, di forma cilindrica e ricoperto dalle guaine fibrose delle foglie. Foglie rigide profondamente incise a picciolo lungo, spinose lungo i margini. Infiorescenze a spadice e frutti drupacei di color giallo rossastro. Fiorisce da maggio a giugno. Predilige un'esposizione soleggiata. Nelle zone più fredde nella stagione invernale questa pianta va protetta con teloni di plastica e con foglie.		E' un albero di modesto vigore, di origine sconosciuta, le foglie sono coriacee, sempreverdi, di forma ovale-oblunga, di colore verde brillante sulla pagina superiore. I fiori (zagara) ermafroditi sono numerosi e bianchi. Il frutto (esperidio) di dimensioni medio-grandi è di forma tondineggiato-piiforme, la buccia è di color giallo citrino e ricca di oli essenziali; la polpa fornisce un succo molto acidico e amargnolo. Cresce bene in ambienti caldi e umidi, ben riparati dai venti, con inverni miti senza ampie escursioni termiche. Il terreno deve essere sciolto o di medio impasto, profondo ben drenato. Questo agrume è coltivato in Calabria e deve la sua importanza economica all'acqua di Colonia, brevettata nel 1704 dall'italiano Giovanni Paolo Fernini, emigrato a Colonia.	
<i>Cinnamomum glanduliferum</i> T. Nessel et Eberm. - 09		<i>Citrus clementina</i> Tan. - Tangerino, Clementina	12
Canfora Fam. Lauraceae		Fam. Rutaceae	
Albero sempreverde, originario di Cina e Giappone, che raggiunge l'altezza di 12 metri o più, con una folta chioma di foglie color verde scuro brillante lunghe 5-12 cm; se vengono stropicciate, le foglie emanano il caratteristico odore della canfora. I fiori sono dioici, in ombrellette ascellari, di color giallo. I frutti sono delle piccole drupe di colore nero a maturità. Tale albero cresce rigoglioso anche in luoghi ad inverno un po' rigido e se ne potrebbe estendere la coltura per l'estrazione della canfora.		E' un albero di elevato vigore, di origine orticola, con portamento assurgente e chioma espansa e con rami senza spine. Le foglie, sempreverdi, sono ovali-oblunghe di colore verde scuro, i fiori (zagara) bianchi sono profumati. I frutti (esperidi) sono di colore arancio in-	

28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

COME RAGGIUNGERE VILLA MONASTERO A VARENNIA

VILLA MONASTERO
Varennia Lago di Como

SONDRIO

LECCO

COMO

VARESE

MILANO

LAGO DI COMO

Aeroporto ORIO AL SERIO

Aeroporto LINATE



In auto

Da Milano
Strada Statale 36 del
Lago di Como e
dello Spluga
1 h 32 min (77 km)
Uscita:
Bellano



In treno

Da Milano
Milano Centrale
Linea Lecco - Tirano
1 h 15 min
(ogni 60 min)
Fermate:
Varennia-Esino



In aereo

Distanza
Aeroporto
Linate - Varennia
1 h 10 min (79 km)
Aeroporto
Orio al Serio - Varennia
1 h 15 min (65 km)

tono, lisci, di forma da oblata a leggermente schiacciata ai poli a globosa, con buccia sottile; la polpa è di colore arancio di tessitura fine e tenera con pochi o senza semi. Questo agrume è probabilmente un ibrido tra il mandarino e l'arancio amaro, è molto diffuso in USA, America Latina, Australia e Sud Africa.

***Citrus limon (L.) Burm. - Limone* 13**
Fam. Rutaceae
Albero, originario di India, Birmania e Cina che può raggiungere un'altezza di 5m con chioma arrotondata; le foglie sempreverdi, sono semplici, ovale lanceolate di 5-10 cm, coriacee, con piccolo alato fino alla base fogliare. I frutti (zagara) sono solitari o portati in racemi, di colore bianco-rosato che si aprono da aprile a dicembre; il limone è specie effluente che può fiorire e fruttificare più volte (fino a 5) in un anno. Il frutto è, come in tutti gli agrumi, un esperidio, tipo particolare di bacca, con forma e dimensione variabile che presenta all'apice una formazione mammellare detta umbone. La polpa di colore giallo citrino presenta tessitura media-grossolana o media con succo più o meno acid. Esige climi temperati, al riparo da venti e senza ampie escursioni termiche, il terreno deve essere profondo, ben drenato. Questo agrume è diffusamente coltivato nell'area mediterranea (Italia, Spagna, Grecia, Turchia) in Cina.

***Citrus medica L. - Cedro* 14**
Fam. Rutaceae
Arbusto o piccolo albero, originario dell'India, di sviluppo irregolare con spine corte e robuste all'ascella delle foglie che sono verde brillante senza ali, persistenti, oblungo-seriate. I frutti (zagara), di colore rosso-violaceo, sono riuniti in racemi all'apice dei rami. Il frutto (esperidio) di colore giallo è molto grande, oblungo od ovale a superficie liscia o rugosa e piena di protuberanze. La buccia molto spessa copre una polpa dal succo più o meno acid. Questa pianta è molto sensibile al freddo e va protetta anche dai venti, esige un terreno profondo, sciolto, ben drenato. La parte più im-

portante di questa pianta è la scorza del frutto, utilizzata per la preparazione di canditi, acqua e sciroppo di Cedro per l'estrazione di oli essenziali.

***Citrus myrtifolia Raf. - Chinotho* 15**
Fam. Rutaceae
Albero di scarso vigore, originario della Cina, molto ramificato con rami privi di spine. Le foglie, persistenti, sono piccole simili a quelle del mirto. I frutti (zagara) sono bianchi molto profumati, piccoli, solitari o riuniti in gruppi e in posizione ascellare o terminale. I frutti (esperidi) sono piccoli, sferici, appiattiti alla base, aperti o con piccoli semi. La buccia è molto sottile, di colore giallo arancio molto profumati, la polpa è gialla poco succosa amara. Questa pianta esige clima temperato con inverni miti e senza ampie escursioni termiche, il terreno deve essere profondo, sciolto ben drenato. I frutti vengono utilizzati per produrre sciroppi, canditi, fruti al liquore, elisir, marmellate, bibite. Viene coltivato solo nella Riviera Ligure di Ponente.

***Citrus paradisi Macf. - Pompelmo* 16**
Fam. Rutaceae
E' una pianta molto vigorosa e di notevoli dimensioni, originaria delle Antille, con chioma arrotondata e densa. Le foglie sono verde brillante, persistenti, con piccolo foglietto largamente alato. Il frutto (esperidio) è grande di forma tondoggeante con buccia di colore giallo pallido e la polpa si presenta di colore giallo o rossiccia. Come tutti gli agrumi esige climi temperati, con inverni miti senza ampi sbalzi di temperatura e al riparo da venti; il terreno deve essere profondo, ben drenato e fertile. Il frutto viene utilizzato per il consumo fresco o per la produzione di succhi.

<i>Citrus reticulata</i> Bianco - Mandarino	17	<i>Cordyline australis</i> (Forst.) Hook. - Cordiline	18
Fam. Rutaceae		Fam. Agavaceae	
Piccoli alberi qualche volta spinosi, originari di Asia meridionale, Asia e sud-est, con chioma globosa e densa. Le foglie sempreverdi sono di colore verde scuro brillante e il piccolo è ampiamente alato. I fiori (zagare) bianchi appaiono in marzo-aprile, sono molto profumati e graditi alle api. I frutti (esperidi) sono di colore arancio, di medie dimensioni, lisci di forma sferica o appiattita, buccia sottile e facilmente staccabile, ricca di un olio essenziale; la polpa è colore arancio con succo abbondante mediamente acido o con o senza semi. Come tutti gli agrumi esige climi temperati, con inverni miti senza eccessi sbalzi di temperatura e al riparo da venti; il terreno deve essere profondo, ben drenato e fertile. Il frutto viene utilizzato soprattutto per il consumo fresco.		E' una pianta originaria dell' Australia e Nuova Zelanda che può raggiungere i 10 m di altezza con chioma sfusa e compatta. Lo stipite è di solito unico o talvolta ramificato in alto; le foglie, persistenti, sono a spada, sottili ed aguzze, coriose, lunghe da 50 a 100 cm. Le infiorescenze sono grandi fino ad un metro a racemo con fiori bianchi che si aprono in aprile-maggio. I frutti sono bacche azzurre lucide di 5mm. Esige clima mite e posizione ben esposta, al riparo da vento e gelo. E' specie piuttosto frugale in fatto di terreno.	
<i>Cocculus laurifolius</i> (Roxb.) DC	18	<i>Cupressus arizonica</i> Greene. not hort. -	21
Fam. Menispermaceae		<i>Cipresso argenteo</i>	
Arbusto eretto originario di Cina e India, alto fino a 3-4 m, glabro; le foglie, sempreverdi sono oblunghe, acute, brillanti, molto decorative. I fiori riuniti in infiorescenze sono insignificanti. Il frutto è una drupa rossa con un unico seme con endosperma carnoso. Esige climi temperati piuttosto luminose ma non in pieno sole su terreni profondi, fertili e ben drenati.		Fam. Cupressaceae	
<i>Colletia cruciata</i> Gil. Et Hook - Collezia	19	<i>Cupressus sempervirens</i> L. - Cipresso	22
Fam. Rhamnaceae		Fam. Cupressaceae	
Arbusto nativo dell' America del Sud che può raggiungere i 3 m di altezza. I ramoscelli secondari, di colore verde-grigio sono appiattiti, coriacei a forma di triangolo terminante in acutissime spine. Le foglie sono, quando esistono, piccolissime e cadono ai primi freddi. I fiori, di colore bianco-giallo, sono profumatissimi e si dischiudono in autunno inverno. Predilige climi temperati in posizioni di pieno sole o mezz'ombra, in terreno ricco, profondo e ben drenato.		Albero con portamento eretto, originario del bacino del Mediterraneo, con chioma che può presentarsi affusolata e svettante (Cv. "Stricta") od espansa (hr. "horizontalis"). Raggiunge un'altezza di 15 - 20 metri. Le foglie sono persistenti, squamose, con apice ottuso, lunghe circa un millimetro. I frutti sono costituiti da gabbuli rotondeggianti con superficie liscia, di colore verde lucido, bruno grigiastri a maturità. Preferite terreni di medio impasto, con presenza di scheletro, aridi, di natura calcarea pur sviluppandosi bene anche su terreni compattati e aridi. Esposizione soleggiata.	

<i>Cycas revoluta</i> Thunb. - Cycas	23
Fam. Cycadaceae	
Pianta molto antica, originaria di Cina e Giappone con fusto cilindrico ricoperto dalle basi permanenti delle foglie; queste sono lunghe fino a 2-3 metri e formate da foglioline lineari di 15-30 cm leggermente arcuate a falce, spine alla sommità, di colore verde cupo, più pallide di sotto. I fiori sono insignificanti. Se è coltivata all'aperto predilige luoghi a mezza ombra e riparati.	
<i>Dasyliiron acrotrichum</i> Zucc. - Dasiliron	24
Fam. Agavaceae	
Arbusto originario del Messico con stipite corto e robusto, alto oltre 1 m; foglie numerose, portate in una densa ombra, verdi, lineari, ricadenti, lunghe un metro e larghe 1 cm, foggiate a pennello all'apice, con margini densamente ricoperti da dentelli. Le infiorescenze sono alte 2-4 m con fiori bianchi, il frutto è una capsula arrotondata. Predilige climi temperati e secchi in pieno sole o a mezza ombra in terreni profondi e ben drenati.	
<i>Dasyliiron longissimum</i> Lem. - Dasiliron	25
Fam. Agavaceae	
E' una pianta natia del Messico con tronco robusto, alto da 1m a 2m nelle piante molto vecchie. Le foglie si irradiano in tutte le direzioni formando una chioma globosa e regolare, sono numerose, persistenti, di colore verde opaco lungo 1,2-1,8 m, generalmente acuminate, larghe 6 mm a sezione quadrata. Le infiorescenze sono alte 2-4 m e il frutto, leggermente dentellato, è lungo 6-9 mm. Predilige climi temperati e secchi in pieno sole o a mezza ombra in terreni profondi e ben drenati.	
<i>Elaeagnus x ebbingei</i> Boom ex Doorenb. -	26
Elaeagn	
Fam. Elaeagnaceae	
Pianta arbustiva, di origine orientale (derivato dall'incrocio tra <i>E. macrophylla</i> x <i>E. pungens</i>) vigorosa, a crescita	
<i>Erythra edulis</i> S. Wats. - Palma blu	27
Fam. Palmaeaceae	
Palma originaria della California e del Messico che raggiunge l'altezza di 10-12 metri con foglie sempreverdi di colore verde blaugastro argenteo, il piccolo tizzo è armato di forti spine. Gli spadici sono allungato-paniculati lunghi fino a 5 - 5,5 dm, due o tre volte ramificati, con spate tubulose. Il frutto globoso non è commestibile. Sono piante eleganti e molto ornamentali, molto rustiche e quindi che possono vegetare in un clima temperato dove si abbia in inverno raramente una escursione sotto zero, amano località ben soleggiate e terreni freschi e ricchi.	
<i>Erythra edulis</i> S. Wats. -	28
Palma della Guadalupe	
Fam. Palmaeaceae	
Palma originaria della Guadalupe che raggiunge l'altezza di 10-12 metri con foglie sempreverdi di colore verde vivace, il piccolo tizzo non è spinoso o appena armato di spine. Gli spadici sono allungato-paniculati, lunghi fino a 1,8 dm, due o tre volte ramificati, con spate tubulose. Il frutto globoso e nero luccico con diametro di 2-5cm ha polpa dolce e commestibile. Sono piante eleganti e molto ornamentali, molto rustiche e quindi che possono vegetare in un clima temperato dove si abbia in inverno raramente una escursione sotto zero, amano località ben soleggiate e terreni freschi e ricchi.	

<i>Eucalyptus globulus</i> Labill. - Eucalipto Fam. Myrtaceae	29	<i>Fortunella margarita</i> (Lour.) Swing. - Kumquat Fam. Rutaceae	32
Albero nativo dell' Australia che può raggiungere i 20-40 m di altezza con chioma ovale o irregolarmente globosa. Le foglie, sempreverdi e aromatiche, sono ovate, in piante adulte alterne, mentre in piante giovani sessili o amplessicaule e più piccole. I fiori si aprono in novembre-dicembre, sono solitari e costituiti da numerosissimi stami inseriti sull'ovario, che è avvolto dal ricettacolo legnoso a forma di trottola da cui si origina il frutto; questo è una capsula grigia emisferica di 2 cm di diametro con 4 costolature. Predilige clima temperato, terreno sciolto, profondo con buon rifornimento idrico.		Piccoli alberi o arbusti di 3-5 m di altezza, originari della Cina meridionale, inermi o con poche spine. Le foglie, sempreverdi, lunghe 7-8 cm sono verde brillante nella pagina superiore, più pallide in quella inferiore, presentano apice arrotondato e base cuneata con margine crenato nella metà superiore. I fiori bianchi, sono solitari o raggruppati in infiorescenze ascellari. Il frutto è piccolo di colore arancio di forma oblungo-ovoide con polpa acida. Questa pianta vegeta bene in pieno sbalzi di temperatura e al riparo da venti; il terreno deve essere profondo, ben drenato e fertile. Il frutto viene utilizzato soprattutto per il consumo fresco o per la produzione di canditi.	
<i>Eupatorium ligustrinum</i> DC. - Eupatorio Fam. Compositae	30	<i>Jubaea spectabilis</i> H.B.K. - Palma del Cile Fam. Palmaeaceae	33
Arbusto sempreverde originario del Messico, con chioma arrotondata alto 2-4m. Ha foglie opposte, verde brillante di forma ellittico-lanceolata, in autunno presenta fiori bianchi con pappo rosato portati su infiorescenze a grappolo larghe 10-20 cm. Esige climi temperati, esposizione a mezz'ombra su terreni profondi, fertili e ben drenati.		Palma originaria dell' America del Sud che raggiunge l'altezza di 20 metri con foglie sempreverdi pennatosette, di 2-4 m, le singole foglioline sono lunghe 20-30 cm, il picciolo è liscio. Infiorescenze a spadice di 60 cm, la fioritura avviene tra luglio e settembre. I frutti sono piccoli, drupacei, gialli di circa 4 cm di diametro. Da queste piante si ricava, incidendo il tronco, un succo dolciastro che fermentato produce liquori. I semi possono essere spremuti permettendo l'estrazione di un olio commestibile. In Europa questa palma, il cui fusto si gonfia in modo singolare verso la metà della sua altezza, coronato da un ciuffo terminale di foglie molto simile a quelle del dattero ma di colore verde più vivo e fresco costituisce una delle migliori piante ornamentali in condizioni climatiche temperate e calde; tuttavia presenta anche una resistenza al freddo assai accentuata riuscendo a resistere negli inverni freddi a temperature sotto i 12°.	
<i>Feijoa sellowiana</i> Berg. - Guaibò del Brasile Fam. Myrtaceae	31		
E' una specie arbustiva, originaria dell'area subtropicale sudamericana sempreverde che arriva a 3-4 m di altezza e altrettanti di larghezza. Le foglie sono ellittiche, spesse e coriacee, di colore sopra verde scuro lucido, sotto bianco-vellutato. I fiori sono portati sui rami dell'anno, solitari in posizione ascellare molto vistosi con petali bianco-cerei esternamente e rossi all'interno. I frutti sono bacche di forma ellittica, ovoidale, derida con polpa, amarutilla, bianco granulosa e fondente di sapore gradevole. Predilige climi temperati senza sbalzi di temperatura e terreni profondi e senza ristagni. Questa pianta è stata introdotta in Italia alla fine del 1800 e si è ben adattata negli ambienti meridionali.			

<i>Lagerstroemia indica</i> L. - Lagerstroemia Fam. Lythraceae	34	<i>Magnolia grandiflora</i> L. - Magnolia bianca Fam. Magnoliaceae	37
Grande arbusto o piccolo alberello originario di Corea, Cina e Giappone che raggiunge un'altezza di 3-7 m con foglie semplici, opposte, decidue, quasi sessili. Corteccia liscia di colore marrone chiaro che si desquama in caratteristiche placche più chiare. Fiori riuniti in pannocchie terminali di vario colore a seconda della varietà, che appaiono da luglio ad ottobre. Cresce bene in terreno argilloso ricco di sostanza organica. Resiste alle basse temperature purché non siano prolungate. Esposizione soleggiata.		Albero originario del Sud degli Stati Uniti con portamento eretto che raggiunge l'altezza di 15-20 metri. Chioma larga e conica che può raggiungere 15-8 metri di diametro. Foglie semplici, alterne persistenti, coriacee, ovate-oblunghe, di colore verde lucente sulla pagina superiore, pelose, e bruno rossastre su quella inferiore. Fiori grandi, bianchi, a forma di coppa, profumati, che compaiono su piante di almeno 15-20 anni di età' durante l'estate. Infruttescenze simili a strobili, lunghe circa 5 cm con all'interno semi rossi. Specie sensibile al gelo. Cresce bene in terreno drenato, profondo, tendenzialmente acido. Esposizione soleggiata.	
<i>Laurus azorica</i> (Seubert) Franco - Alloro delle Canarie Fam. Lauraceae	35	<i>Musa x paradisiaca</i> L. - Banano Fam. Musaceae	38
E' un albero originario delle Isole Canarie alto sino a 20 m, le foglie sono persistenti, aromatiche se strofinate, vellutate di forma ovato - ovale, verde scuro di sopra, pallide e tormentose lungo la nervatura centrale al rovescio. I fiori sono verde-pallido, tormentosi e portati in ombrelle ascellari. Il frutto è una bacca ovale e lunga. Esige clima temperato-umido con esposizione in mezza ombra.		Piante erbacee originarie dell'Oriente asiatico, Sri Lanka, Arcipelago Malese, Polinesia che possono raggiungere i 6 m di altezza. Le foglie verde chiaro sono lunghe fino a 2 m e larghe 30-40 cm, sono portate da un lungo peduncolo cavo e partono dal rizoma sotterraneo; i singoli fiori sono riuniti in infiorescenze spiciformi, quelle superiori sono di fiori maschili quelle inferiori di fiori femminili; il frutto assume l'aspetto di una bacca allungata con polpa a maturazione, consistente e aromatica, con i semi spesso abortiti. In Italia questa specie anche negli ambienti più caldi riesce solamente a vegetare o ad avere scarsa produzione, tuttavia ha una notevole valenza ornamentale.	
<i>Laurus nobilis</i> L. - Alloro Fam. (Lauraceae)	36	<i>Myrtus communis</i> var. 'tarentina' - Mirto Fam. Myrtaceae	39
Piccolo alberello o arbusto, originario delle regioni mediterranee che raggiunge l'altezza massima di 7-10 m. Le foglie semplici sono alterne, persistenti di color verde scuro lucide sulla parte superiore, più chiare ed opache sulla pagina inferiore, di forma lanceolata, coriacee a margine intero, ondulato, provviste di ghiandole che emanano in seguito a sfregamento un gradevole odore aromatico. Le piante femminili producono drupe contenenti un seme oleoso di color nero lucido. Cresce bene in terreno sciolto, fresco, anche periodicamente asciutto, ben drenato. Esposizione di pieno sole o leggermente ombreggiata. Soffre le gelate tardive e il freddo prolungato.		Arbusto originario dell'area mediterranea alto fino a 3-4 m con chioma emisferica, globosa; le foglie sempreverdi, sono aromatiche, semplici, ovate, acute, rigide, lunghe 1-2 cm con margine intero. I fiori bianchi, solitari o a due all'ascella fogliare sono pedunculati e si aprono in giugno-agosto. Il frutto è una bacca ellittica di 1 cm di diametro di colore bianco. Esige climi temperati e posizione soleggiata.	

<i>Nerium oleander</i> L. - Oleandro Fam. Apocynaceae	40	<i>Phoridium tenax</i> J.R. et G. Forst. - Formium Fam. Agavaceae	43
Arbusto o piccolo albero originario del bacino del mediterraneo che raggiunge l'altezza di 6 metri con rami lunghi e flessibili. Le foglie sono semplici, persistenti, brevemente picciolate, lanceolate, intere ai margini o revolute, apice acuto, di colore verde intenso, con nervatura principale molto evidente. I fiori sono ermafroditi riuniti in corimbi terminali di colore diverso in funzione della varietà da giugno a settembre. I frutti sono costituiti da capsule allungate e compresse contenenti semi muniti di pappo rossastro. Tutta la pianta e' velenosa sia per gli uomini che per gli animali. Cresce bene in ambienti secchi e in terreni argillosi. Esposizione soleggiata.		Pianta originaria della Nuova Zelanda, Isola Norfolk, il cui apparato ipogeo è costituito da un corto e spesso rizoma, carnoso sotterraneo, da cui fuoriescono numerose foglie lunghe fino a 2 m, ensiformi, rigide, oblique, di colore verde scuro sulla pagina superiore e più pallide in quella inferiore, con margine e carena di colore rosso-bruno; presentano una fessura apicale che le lacera nel lembo, dividendole in due parti. Lo scapo florale, una pannocchia, compare in agosto ed è alta 3-4 m con fiori gialli o rossi lunghi da 5 a 6 cm. Esige clima temperato, al riparo da venti in posizione soleggiata, il terreno deve essere fresco e profondo. La Cv. Variegatum differisce per il fogliame con variegature biancocrema.	
<i>Nymphaea alba</i> L. - Ninfea Fam. Nymphaeaceae	41	<i>Pittosporum tobira</i> Ait. - Pittosporo Fam. Pittosporaceae	46
Pianta palustre, originaria dell'Asia, con fusto carnoso, rizomatoso e tuberoso, ricco di tessuti aeriferi. Foglie semplici, cordate alla base o peltate, con pagina superiore protetta da uno strato di cera e pagina inferiore di colore rosso per la presenza di antocianina. Fiori di colore bianco, solitari, che si aprono al sole se il tempo è asciutto e sereno. Frutto arrotondato, coriaceo che matura sott'acqua nel fango. La temperatura dell'acqua è una caratteristica importante per queste piante, infatti la fioritura è tanto più bella quanto maggiore è il riscaldamento dell'acqua. Esposizione soleggiata. Pianta velenosa (rizoma).		Arbusto o piccolo albero originario di Giappone, Corea e Cina che raggiunge l'altezza di 8-10 metri. Le foglie sono semplici, alterne, persistenti, arrotondate all'apice, munite di corto picciolo di colore verde scuro lucido sulla pagina superiore, più chiaro su quella inferiore. I fiori sono profumati, di colore bianco e appaiono in aprile-maggio. I frutti sono costituiti da capsule globose che si aprono attraverso quattro valve coriacee e legnose. Specie senza particolari esigenze di terreno purché drenato. Esposizione soleggiata.	
<i>Phyllostachys bambusoides</i> Sieb. & Zucc. - Bambù Fam. Graminaceae	44	<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.)D. Don - Podocarpo Fam. Podocarpaceae	47
Graminacea di grandi dimensioni originaria di Cina e Giappone che raggiunge i 2-7 metri di altezza. I fusti sono verdi o giallo oro, con un diametro sino a 20 cm, solcati da un lato. Le foglie sono oblunghe, lunghe 110-115 mm e larghe 12-16 mm, glauche di sotto. Il fiore è costituito da spigheette a 3-5 fiori fertili ed 1 sterile. Cresce bene in terreno fresco. Esposizione soleggiata o parzialmente ombreggiata.		Albero, originario del Giappone, che può raggiungere un'altezza di 10 m e una larghezza di 3-5 m. Presenta lunghe foglie lineari, persistenti, verde brillante superiormente e glauche nella pagina inferiore. Il seme è ovoidale posto su un ricettacolo che diventerà carnoso di colore rosso-violaceo scuro, un po' pruinoso. Cresce bene in climi temperati e in posizione riparata.	
<i>Phoenix dactylifera</i> L. - Dattero Fam. Palmaeaceae	42	<i>Prunus laurocerasus</i> L. - Lauroceraso Fam. Rosaceae	48
Palma originaria dell'Africa, che raggiunge l'altezza di 30 metri con foglie sempreverdi pennatosette, arcuate, lunghe fino a 3-5 m; foglioline di 30-40 cm, opposte. Infiorescenze unisessuali a spadice; quelle maschili lunghe circa mezzo metro mentre quelle femminili raggiungono i 1,5-2 m. I frutti, commestibili, dotti dattero, sono di forma ellissoidale, lunghi 3-6 cm di colore da giallo a bruno. Tollera forte insolazione e clima siccitoso, se compensato da abbondante umidità del terreno; la troviamo infatti a popolare le oasi africane dove l'apparato radicale molto vigoroso può raggiungere la falda freatica. Di questa piante viene utilizzato il legname per costruzione, mentre dal tronco inciso si ricava un succo dolciastro che fermentato produce un liquore detto laghbi in arabo, le foglie sono utilizzate per produrre stuole. Ma il prodotto più importante di questa pianta sono i suoi frutti, datteri, che rappresentano in molte regioni tropicali un alimento base per le popolazioni locali e per gli animali domestici.		Arbusto vigoroso originario dell' Europa Orientale e Asia Minore che raggiunge l'altezza di 5-7 metri. Le foglie	

<i>Pinus montezumae</i> A. B. Lambert - Pino di Montezuma Fam. Pinaceae	45	<i>Quercus ilex</i> L. - Leccio Fam. Fagaceae	49
E' una grossa conifera, originaria di Guatemala e Messico, che può raggiungere i 20 m di altezza e una larghezza di 8-10 m con chioma espansa. La foglie sono aghiformi, lunghe fino a 30 cm portate in gruppi di 5 finemente dentate e leggermente rugose sul margine. I fiori maschili sono viola per divenire gialli all'apertura, quelli femminili sono rossi. Il frutto è una pigna, singola o in grappoli, conica di 15 cm di lunghezza, blu-viola e rosso-marrone a maturità con squame dall'apice appuntito. Cresce bene in climi temperati e con buona esposizione.		Albero vigoroso e maestoso originario del bacino del Mediterraneo che può raggiungere un'altezza di 25 m, con chioma molto espansa e fogliame fitto. Le foglie sono sempreverdi e possono essere a margine intero o dentato, di colore verde scuro lucente, più chiaro sulla pagina inferiore. I fiori maschili sono riuniti in amenti, quelli femminili sono localizzati all'ascella delle foglie e compaiono in giugno. I frutti sono costituiti da ghiande di circa 2 cm di lunghezza. Cresce in ogni tipo di terreno, purché ben drenato. Esposizione in pieno sole, soffre per le gelate intense.	
<i>Pittosporum tobira</i> Ait. - Pittosporo Fam. Pittosporaceae	46	<i>Quercus pubescens</i> Willd. - Roverella Fam. Fagaceae	50
Arbusto o piccolo albero originario di Giappone, Corea e Cina che raggiunge l'altezza di 8-10 metri. Le foglie sono semplici, alterne, persistenti, arrotondate all'apice, munite di corto picciolo di colore verde scuro lucido sulla pagina superiore, più chiaro su quella inferiore. I fiori sono profumati, di colore bianco e appaiono in aprile-maggio. I frutti sono costituiti da capsule globose che si aprono attraverso quattro valve coriacee e legnose. Specie senza particolari esigenze di terreno purché drenato. Esposizione soleggiata.		Albero di altezza media (15-20 m) originario della regione submediterranea europea e dell'Asia, con fusto spesso tortuoso, corto, con chioma rotonda, chiara e diffusa. E' una specie molto variabile sia per le dimensioni che il taglio delle foglie e la grossezza e la forma dei frutti: le foglie possono essere appena lobate o incise fin quasi alla nervatura mediana in un numero di lobi poco preciso come quello delle nervature laterali. Caratteristica delle foglie è la copertura vellutata grigiastria sulla pagina inferiore. Queste foglie sono marcescenti, cioè rimangono sull'albero, secche, fino alla primavera seguente. Le ghiande sono talvolta piccole e quasi sferiche, talvolta cilindrico-coniche, allungate, talvolta ovoidali e grosse. La roverella cresce di preferenza sui terreni calcarei secchi e perfino sugli altipiani calcarei più aridi. Può alzarsi fino a 1500 m in montagna, sui versanti ben esposti. Nella bassa regione mediterranea, la roverella cerca i luoghi freschi e le esposizioni a Nord.	
<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.)D. Don - Podocarpo Fam. Podocarpaceae	47		
Albero, originario del Giappone, che può raggiungere un'altezza di 10 m e una larghezza di 3-5 m. Presenta lunghe foglie lineari, persistenti, verde brillante superiormente e glauche nella pagina inferiore. Il seme è ovoidale posto su un ricettacolo che diventerà carnoso di colore rosso-violaceo scuro, un po' pruinoso. Cresce bene in climi temperati e in posizione riparata.			
<i>Prunus laurocerasus</i> L. - Lauroceraso Fam. Rosaceae	48		
Arbusto vigoroso originario dell' Europa Orientale e Asia Minore che raggiunge l'altezza di 5-7 metri. Le foglie			

<i>Wisteria sinensis</i> Sweet - Glicine Fam. Papilionaceae	54
Pianta sarmentosa di notevole vigoria, originaria della Cina. I fusti sono legnosi, robusti, volubili, e l' apparato radicale è potentissimo. Le foglie sono caduche, composte, imparipennate, formate da foglioline ovate-lanceolate, appuntite, di colore verde più o meno intenso. I fiori papilionacei sono di color azzurro violetto, lievemente profumati, riuniti in grappoli penduli in marzo-aprile. E' una pianta velenosa (corteccia, radice, semi). Cresce bene in tutti i terreni esclusi quelli troppo calcarei. Ama esposizione soleggiata.	
<i>Yucca aloifolia</i> 'Variegata' - Baionetta spagnola Fam. Agavaceae	55
Arbusto sempreverde originario di Stati Uniti e Messico, di lenta crescita, alto e largo 2 m con poche ramificazioni. Ha foglie a forma di spada di colore verde scuro brillante, bordate di giallo lunghe 50-75 cm, rigide e pungenti. In estate emette lunghe pannocchie porporo che portano fiori bianchi. Il frutto è una capsula di colore rosso scuro. Questa pianta va utilizzata per la formazione di pergolati o per farla arrampicare su un'altra pianta. Esige climi caldi e temperati, esposizioni di pieno sole e il terreno deve essere drenato, fertile e profondo.	
<i>Taxus baccata</i> L. - Tasso, albero della morte Fam. Taxaceae	52
Pianta rampicante, originaria della Cina, senza spine, molto vigorosa che può allungarsi fino a 15 m. Le foglie, persistenti, sono composte da 3-5 foglioline oblungo-lanceolate, dentate, glabre. I fiori, leggermente profumati e riuniti in mazzi sono larghi 3-3,5 cm, sono di colore giallo semplici. Raramente produce frutti che sono grandi come un pisello di colore rosso scuro. Questa pianta va utilizzata per la formazione di pergolati o per farla arrampicare su un'altra pianta. Esige climi caldi e temperati, esposizioni di pieno sole e il terreno deve essere drenato, fertile e profondo.	
<i>Yucca gloriosa</i> L. - Iucca Fam. Liliaceae	56
Pianta perenne di tipo arbustivo, originaria dell' America Nord-orientale, talora anche arboreescente, con foglie coriacee a ciuffo poste alla sommità del fusto, che cresce a mano a mano con il passare degli anni. Le foglie sono di colore verde glauco, lineari, piuttosto coriacee, aguzze, a bordi non dentati, tranne che nell'epoca giovanile, a tinta rosso-bruno. L'infiorescenza è a pannocchia ed è alta 1-2 metri, a fiori penduli di colore bianco crema macchianti di rosso esternamente e a sepalii aguzzi. Fiorisce da luglio a settembre. Predilige l'esposizione in pieno sole ed un terreno sostanzioso, permeabile e sabbioso. È una specie che nelle regioni a clima mite resiste bene anche durante l'inverno in condizioni normali; nelle regioni a clima piuttosto rigido la pianta deve essere protetta. Esiste la Cv. Variegata con foglie variegata di giallo-crema.	



Provincia di Lecco

Villa Monastero
VARENNA

Regione Lombardia

VILLA MONASTERO
VIALE POLVANI, 4
VARENNA (LC) | ITALIA | LAGO DI COMO

CONTATTI
T. +39 0341.295450
villa.monastero@provincia.lecco.it
facebook.com/villamonasterolc
instagram.com/villamonastero

villamonastero.eu

Seguici su

IL GIARDINO BOTANICO | GLICINI

1. PASSEGGIATA A LAGO
2. FONTANA DELLE CONCHIGLIE E ZONA TEMPIETTO
3. CAPELVENERE NELLA ZONA DELLE FELCI

IL GIARDINO BOTANICO | PIANTE IGROFILE E DI ZONA OMBROSA

1. VASCA DELLE NINFE
2. FONTANA DELLE CONCHIGLIE E ZONA TEMPIETTO
3. CAPELVENERE NELLA ZONA DELLE FELCI

IL GIARDINO BOTANICO | PALME E CIPRESSI

1. VASCA DELLE NINFE
2. FONTANA DELLE CONCHIGLIE E ZONA TEMPIETTO
3. CAPELVENERE NELLA ZONA DELLE FELCI

IL GIARDINO BOTANICO | AGRUMI

1.2.3. VIALE DELLE PALME E DEGLI AGRUMI